


Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης–Σαλατοπατάτα και για Εξαγωγή

έκδοση 2009 - 01

- * Πολύ καλή γεύση
- * Σφιχτή μετά το μαγείρεμα
- * Πολύ ωραία επιδερμίδα
- * Μεγάλος αριθμός κονδύλων
- * Καλή παραγωγή



Χαρακτηριστικά

Τύπος μαγειρέματος	A
Ωρίμανση	Πρώιμη
Παραγωγή	Καλή
Μέγεθος κονδύλων	Μικρό
Σχήμα κονδύλων	Μακρουλοί-ωοειδείς/μακρ.
Αριθμός κονδύλων	Μεγάλος
Χρώμα σάρκας	Σκούρο κίτρινο
Χρώμα επιδερμίδας	Κίτρινο
Μούρα	Δεν έχει
Περίοδος λήθαργου	Μικρός
Φύτρωμα	Γρήγορο
Ευαισθησία στο Sencor	Μάλλον ευαίσθητη
Ανάπτυξη φυλλώματος	Μέτρια
Εσωτερικός μωλωπισμός	Δεν είναι ευαίσθητη
Κονδυλοποίηση φύτρων	Δεν είναι ευαίσθητη
Ξηρή ουσία	18,5
Βάρος κάτω από νερό	335
Χρυσονηματώδης	Ανθεκτική: Ro1,2/3,4,5 Ευαίσθητη: Pa2
Καρκίνος των κονδύλων	Ανθεκτική: fysio 1 Ανθεκτική: fysio 2
Δακτυλιοειδής κηλίδωση*	Ανθεκτική
Περονόσπορος φύλλων	Ευαίσθητη
Περονόσπορ. κονδύλων	Πολύ ευαίσθητη
Ακτινομύκωση	Ευαίσθητη
Σπογγοσπορίωση	Ελαφρά ευαίσθητη
PVYη	Ανθεκτική
Ανοχή κονδύλων	Πολύ ευαίσθητη

*Προκαλείται από τον ιό TRV

Πληθυσμοί φυτών

Χρησιμοποίησε χωράφι που δεν έχει Ακτινομύκωση. Αυτές οι συμβουλές φύτευσης στοχεύουν στη παραγωγή κονδύλων μεγέθους 35-55

Βάθος φύτευσης

Πρώιμη φύτευση: Κανονικό βάθος
Όψιμη φύτευση: 2-3 εκ. βαθύτερα του κανονικού για να έχουμε πιο δυνατά φυτά και καλύτερη χρήση των λιπασμάτων.

Αριθμός φυτών με αποστάσεις αυλακιών 75 εκ.

28/35 περίπου 6.000 κόνδυλοι / στρ περίπου 22 εκ.
32/40 περίπου 4.800 κόνδυλοι / στρ περίπου 28 εκ.
40/50 περίπου 4.000 κόνδυλοι / στρ περίπου 33 εκ.

Μέτρησε τους κονδύλους/σακί για σωστό υπολογισμό

Λίπανση

Η λίπανση συνιστάται να γίνει μετά από εδαφολογική ανάλυση.
Η Annabelle χρειάζεται κανονική λίπανση. Στο ξεκίνημα συνιστάται να δίνεται το 120 % των αναγκών του Αζώτου για να διατηρείται η καλλιέργεια ζωντανή.


Περιορίσε την Αζωτούχο λίπανση όσο πλησιάζει η ωρίμανση για να εξασφαλιστεί άριστη (μαγειρικά) ποιότητα και να διευκολυνθεί ο καλός λήθαργος.

Μια πλούσια Φωσφορική λίπανση λίγο πριν τη φύτευση αυξάνει το ριζικό σύστημα με αποτέλεσμα να έχουμε ζωηρότερα φυτά.

Κάλιο, ανάλογα με την εδαφολογική ανάλυση

Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης–Σαλατοπατάτα και για Εξαγωγή

Προετοιμασία και φύτεμα



- Η προβλάστηση είναι κατάλληλη για πατατόσπορο > 35 χλ
- Οι κόνδυλοι μπορούν επίσης να φυτευτούν με μικρά άσπρα φύτρα.
- Μη φυτέψεις τις πατάτες κατευθείαν από το ψυγείο αλλά άφησε το προϊόν να εγκλιματιστεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Φύτεψε 3 εκ. Βαθύτερα από το κανονικό. Αυτό ευνοεί το ριζικό σύστημα και την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων.
- Όταν το προϊόν αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το μυκητοκτόνο Azoxystrobin για να εμποδίσει την ανάπτυξη της Αργυρόχρωμης Κηλίδωσης.
- Συνιστάται η καταπολέμηση της Ριζοκτόνια (Rhizoctonia) κατά το φύτεμα.

Κόψιμο:


- Η Annabelle αντιδρά καλά στο κόψιμο των μεγάλων κονδύλων.
- Κόψε μεταξύ 1 και 4 βδομάδες πριν το φύτεμα.

Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια




- Μετά το φύτεμα, χρησιμοποίησε Sencor μόνο σε μικρές δόσεις.
- Μέχρι να φθάσουν οι κόνδυλοι τα 45 χλ, το φύλλωμα πρέπει να διατηρείται ζωηρό.
- Επιφανειακές λιπάνσεις πρέπει να δίνονται μόνο σε περιορισμένες ποσότητες.
- Υπερβολική λίπανση θα δημιουργήσει πλούσιο φύλλωμα με αποτέλεσμα να ευνοηθεί ο περονόσπορος, να έχουμε χαμηλό ποσοστό ξηρής ουσίας, λιγότερη γεύση και κακή υφή!
- Άρχισε έγκαιρα τους ψεκασμούς για τον Περονόσπορο.
- Αργότερα ψέκασε με φυτοφάρμακα που προστατεύουν καλύτερα το κόνδυλο.
- Στο δεύτερο μέρος της καλλιεργητικής περιόδου, άσε τα φυτά να ωριμάσουν φυσιολογικά. Αυτό θα εμποδίσει το λήθαργο των κονδύλων και την ευαισθησία τους στο στρεσάρισμα.
- Κανονικό πότισμα, ευνοεί το κανονικό φούσκωμα των κονδύλων.

Καταστροφή φυλλώματος και συγκομιδή



- Το φύλλωμα πρέπει να καταστραφεί στην ωρίμανση για να έχουμε ωραία και ψημένη επιδερμίδα. Έτσι έχουμε καλύτερο λήθαργο και αποθηκευτική ικανότητα των κονδύλων.
- Για το καλό ψήσιμο της επιδερμίδας χρειάζονται τουλάχιστο 2 βδομάδες μετά τη καταστροφή του φυλλώματος.
- Αν το χωράφι είναι στεγνό, πότισε ελαφρά πριν τη συγκομιδή για να αποφύγεις τις ζημιές
- Να αποφεύγεις γενικά τις ζημιές κατά τη συγκομιδή.
- Μικροζημιές θα προκαλέσουν αφυδάτωση των κονδύλων και γρήγορο φύτεμα.
- Μη συγκομίσεις πάνω από 25°C για να αποφύγεις το σάπισμα κατά τη μεταφορά.
- Όταν οι θερμοκρασίες είναι πάνω από 25°C, συγκόμισε νωρίς το πρωί ή καλύτερα τη νύχτα.
- Τα Jumbo bags πρέπει να έχουν λωρίδες αερισμού.
- Η κορυφή των Jumbo bags στο χωράφι πρέπει να προστατευτεί από **ηλιόκαμα**.

Αποθήκευση



- Αν το προϊόν αποθηκευτεί προσωρινά, συνιστάται η θερμοκρασία να είναι 10° C.
- Η μεταφορά πρέπει να γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία σε θερμοκρασία 10° C.
- Ο αερισμός πρέπει να γίνεται κανονικά (2 φορές την ημέρα) για να αποφευχθεί η αύξηση του CO2.
- Όταν φτάσει στο τελικό προορισμό το προϊόν πρέπει να αποθηκευτεί στους 10° C.
- Οποιαδήποτε διακύμανση της θερμοκρασίας θα επηρεάσει τη διακοπή του λήθαργου.