


## Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης

έκδοση 2009 - 01

- \* Πολύ πρόωμη ωρίμανση
- \* Ομοιόμορφοι κόνδυλοι
- \* Γυαλιστερή επιδερμίδα
- \* Μεγάλο μέγεθος
- \* Συγκομίζεται πρώιμα



### Χαρακτηριστικά

Τύπος μαγειρέματος	AB
Ωρίμανση	Πρώιμη
Ωριμη παραγωγή	Μάλλον ψηλή
Μέγεθος κονδύλων	Πολύ μεγάλο
Σχήμα κονδύλων	Ωσειδές
Αριθμός κονδύλων	Μικρός αριθμός κονδύλων
Χρώμα σάρκας	Κίτρινο
Χρώμα επιδερμίδας	Κίτρινο
Μούρα	Λίγα

Περίοδος ληθάργου	Μέσος όρος
Φύτρωμα	Κανονικό
Ευαισθησία στο Sencor	Μάλλον ευαίσθητη
Ανάπτυξη φυλλώματος	Μέτρια
Εσωτερικός μωλωπισμός	Μάλλον ευαίσθητη
Κονδυλοποίηση φύτρων	Μάλλον ευαίσθητη
Ξηρή ουσία	17,3
Βάρος κάτω από νερό	311

Χρυσονηματώδης	Ανθεκτική t: Ro1,2/3,4 Ευαίσθητη: Ro5
Καρκίνος των κονδύλων	Ανθεκτική: fysisio 1 Ευαίσθητη: fysisio 2

Δακτυλιοειδής κηλίδωση*	Ελαφρά Ευαίσθητη
Περονόσπορος φύλλων	Ευαίσθητη
Περονόσπορ. κονδύλων	Ελαφρά Ευαίσθητη
Ακτινομύκωση	Ελαφρά Ευαίσθητη
Σπογγοσπορίωση	Ελαφρά Ευαίσθητη
PVYη	Πολύ ευαίσθητη
Ανοχή κονδύλων Yntn	Ελαφρά Ευαίσθητη

\*Προκαλείται από τον ιό TRV

### Πληθυσμοί φυτών

Αγορά: 40-65 χλ  
Βάθος φύτευσης: 3- 4 cm βαθύτερα από το κανονικό.

Ενδεικτικές αποστάσεις φύτευσης όταν η απόσταση μεταξύ των αυλακιών είναι 75 εκ.

28/35 χλ. 7.400 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 18 εκ.  
35/50 χλ. 5.600 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 24 εκ.  
50/55 χλ. 4.400 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 30 εκ.

Μέτρησε τους κονδύλους/σακί για σωστό υπολογισμό

### Λίπανση

Προσάρμοσε τη λίπανση ανάλογα με την εδαφολογική ανάλυση.

Άζωτο(N): περίπου 120% σε σύγκριση με άλλες πρώιμες ποικιλίες.

Εφαρμογή: 4/5 σαν βασική, 1/5 αμέσως μετά τη κονδυλοποίηση.

Η διαθεσιμότητα των λιπασμάτων να είναι σταθερή.

Η κακή ανάπτυξη θα δημιουργήσει σχισίματα.

Η Carrera είναι ευαίσθητη στις τροφοπενίες.


Η εφαρμογή ιχνοστοιχείων είναι αναγκαία.

Το Μαγγάνιο και το Μαγνήσιο δημιουργούν ζυηρά φυτά και προλαμβάνουν την πρόωρη γήρανση.

Επί πλέον συνιστάται η εφαρμογή Βορίου σε χωράφια που το έχουν ανάγκη.

## Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης

### Προετοιμασία και φύτεμα



- Κανονική περίοδος ληθάργου.
- Μπορεί να φυτευτεί με μικρά άσπρα φύτρα. Το κορυφαίο φυτό αφαιρείται αν είναι μεγάλο.
- Σε μολυσμένα χωράφια, η καταπολέμηση της Ριζοκτόνια κατά τη φύτευση είναι αναγκαία.
- Κάνε μεγάλα σαμάρια για να αποφύγεις το πρασίνισμα των κόνδυλων.

### Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια




- Τα καλύτερα αποτελέσματα λαμβάνονται σε πλούσια και βαριά χωράφια με καλή δομή.
- Η ανάπτυξη του φυλλώματος είναι μέτρια, γι' αυτό μια αρχική ψηλή δόση N είναι απαραίτητη
- Συνιστάται η προφυτρωτική εφαρμογή του Sencor , ή μεταφυτρωτικά σε μικρές δόσεις.
- Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν σοβαρά το αποτέλεσμα. Προσάρμοσε τη δόση σ' αυτές τις συνθήκες.
- Κάνε προληπτικούς ψεκασμούς για τη καταπολέμηση της Αλτερνάρια στη κατάλληλη εποχή.
- Καταπολέμηση Περονόσπορου
  - \* Κάνε νωρίς προληπτικούς ψεκασμούς για τη καταπολέμηση του Περονόσπορου με φάρμακα τα οποία καταπολεμούν ταυτόχρονα και την Αλτερνάρια.
  - \* Κάνε εναλλαγή των φαρμάκων.
  - \* Αργότερα, χρησιμοποίησε φάρμακα που προστατεύουν καλύτερα τον κόνδυλο.
- Κάνε κανονικά ποτίσματα για να πετύχεις ομοιόμορφη ανάπτυξη.
- Μεγάλη ανάπτυξη στο δεύτερο μέρος της ζωής της καλλιέργειας δεν είναι επιθυμητή.

### Καταστροφή φυλλώματος και συγκομιδή



- Γενικά, οι κόνδυλοι της Carrera αποσπώνται εύκολα από τους στόλους.
- Πάρε τις αναγκαίες προφυλάξεις για να αποφύγεις τις μηχανικές βλάβες και τους εσωτερικούς μώλωπες.
- Περίορισε το ύψος πτώσης κατά τη συγκομιδή και την αποθήκευση.

### Αποθήκευση



- Η Carrera είναι πρώιμη ποικιλία και επομένως οι πωλήσεις γίνονται αμέσως ή σε 1-2 μήνες μετά τη συγκομιδή.
- Για αποθήκευση πέραν των 3 μηνών χρειάζεται μηχανική ψύξη.