


Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης

έκδοση 2009 - 01

- * Καλή παραγωγή για πρώιμη ποικιλία
- * Γεμάτοι κόνδυλοι
- * Δυνατή
- * Εξαιρετική γεύση
- * Ομοιόμορφο σχήμα



Χαρακτηριστικά

Τύπος μαγειρέματος	AB
Ωρίμανση	Πρώιμη
Παραγωγή	Καλή
Μέγεθος κονδύλων	Πολύ μεγάλοι
Σχήμα κονδύλων	Στρόγγυλοι-ωσειδείς/ωσειδ
Αριθμός κονδύλων	Μικρός
Χρώμα σάρκας	Ελαφρά κίτρινη
Χρώμα επιδερμίδας	Κίτρινη
Μούρα	Δεν έχει
Περίοδος λήθαργου	Μέσος όρος
Φύτρωμα	Κανονικό
Ευαισθησία στο Sencor	Ευαίσθητη
Ανάπτυξη φυλλώματος	Καλή
Εσωτερικός μωλωπισμός	Δεν είναι ευαίσθητη
Κονδυλοποίηση φύτρων	Μάλλον ευαίσθητη
Ξηρή ουσία	19,3
UWW	351
Χρυσονηματώδης	Ευαίσθητη: Ro1,2/3,4,5 Pa2,3
Καρκίνος των κονδύλων	Ανθεκτική: fysio 1
Δακτυλιοειδής κηλίδωση*	Ανθεκτική
Περονόσπορος φύλλων	Ευαίσθητη
Περονόσπορ. κονδύλων	Ευαίσθητη
Ακτινομύκωση	Ελαφρά ευαίσθητη
Σπογγοσπορίωση	Ευαίσθητη
PVYη	Ευαίσθητη
Ανοχή κονδύλων Yntn	Ελαφρά ευαίσθητη

Πληθυσμοί φυτών

Συμβουλές για αποστάσεις φύτευσης όταν η απόσταση μεταξύ των αυλακιών είναι 75 εκ.

28/35 χλ. 5.100 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 26 εκ.
35/50 χλ. 4.750 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 28 εκ.
50/55 χλ. 4.550 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 30 εκ.


Λίπανση

Η Jaerla χρειάζεται πλούσια Αζωτούχος λίπανση. Η Αζωτούχος λίπανση είναι περίπου 27,5 χλγ Ν/στρ. περιλαμβανομένων και των αποθεμάτων εδάφους. Καλή λίπανση με Φώσφορο και Κάλι μπορεί να αυξήσει την παραγωγή.

*Προκαλείται από τον ιό TRV

Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης

Προετοιμασία και φύτεμα




- Ευαίσθητη στη κονδυλοποίηση των φύτρων.
- Μην αφαιρέσεις τα φύτρα πάνω από μια φορά.
- Απόφυγε να φυτέψεις πολύ πρώιμα και σε κρύο έδαφος.

Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια



- Ευαίσθητη στο Sencor.
- Το φύτεμα είναι μάλλον γρήγορο. Καλή ανάπτυξη του φυλλώματος και καλή κάλυψη του εδάφους.
- Γρήγορη κονδυλοποίηση. Οι κόνδυλοι θα μεγαλώσουν και θα ωριμάσουν νωρίς.
- Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται κανονικοί ψεκασμοί στη κατάλληλη εποχή για τη καταπολέμηση του Περονόσπορου.

Καταστροφή φυλλώματος και συγκομιδή



- Λίγο ευαίσθητη στις μηχανικές βλάβες.
- Δεν είναι ευαίσθητη στους εσωτερικούς μώλωπες.

Αποθήκευση



- Ο λήθαργος είναι μέτρια μεγάλος και η αποθηκευτική ικανότητα μάλλον καλή.
- Η θερμοκρασία αποθήκευσης σε ψυγεία είναι γύρω στους 7°C.