


Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης

έκδοση 2009 - 01

- * Πρώιμη
- * Ψηλή παραγωγή
- * Ωραία γυαλιστερή επιδερμίδα
- * Μεγάλοι κόνδυλοι
- * Καλή περιεκτικότητα ξηρής ουσίας



Χαρακτηριστικά

Τύπος μαγειρέματος	B
Ωρίμανση	Πρώιμη
Παραγωγή	Ψηλή
Μέγεθος κονδύλων	Μεγάλοι
Σχήμα κονδύλων	Μακρουλοί-ωοειδείς
Αριθμός κονδύλων	Μέσος όρος
Χρώμα σάρκας	Ελαφρά κίτρινη
Χρώμα επιδερμίδας	Κίτρινη
Μούρα	Δεν έχει
Περίοδος λήθαργου	Μικρός
Φύτρωμα	Γρήγορο
Ευαισθησία στο Sencor	Μέτρια ευαίσθητη
Ανάπτυξη φυλλώματος	Καλή
Εσωτερικός μωλωπισμός	Μέτρια ευαίσθητη
Κονδυλοποίηση φύτρων	Μέτρια ευαίσθητη
Ξηρή ουσία	20,1
UWW	368
Χρυσονηματώδης	Ανθεκτική: Ro1,2/3,4,5 Ευαίσθητη: Pa2,3
Δακτυλιοειδής κηλίδωση*	Ανθεκτική
Περονόσπορος φύλλων	Ευαίσθητη
Περονόσπορ. κονδύλων	Ελαφρά ευαίσθητη
Ακτινομύκωση	Ευαίσθητη
Σπογγοσπορίωση	Πολύ ευαίσθητη
PVYη	Ανθεκτική
Ανοχή κονδύλων	Πολύ ευαίσθητη

Πληθυσμοί φυτών

Ενδεικτικές αποστάσεις φύτευσης όταν η απόσταση μεταξύ των αυλακιών είναι 75 εκ.

28/35 χλ. 4.600 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 29 εκ.
35/50 χλ. 4.050 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 33 εκ.
50/55 χλ. 3.850 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 35 εκ.

Λίπανση

Συνιστάται πλούσια Αζωτούχος λίπανση σε σπαστές δόσεις.


Η Αζωτούχος λίπανση είναι περίπου 27,5 χλγ Ν/στρ. περιλαμβανομένων και των αποθεμάτων εδάφους.

Μέτρια οργανική λίπανση φαίνεται ότι έχει θετικά αποτελέσματα.

*Προκαλείται από τον ιό TRV


Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης

Προετοιμασία και φύτεμα



- Ο λήθαργος είναι μάλλον μικρός. Όταν διακοπεί τα φύτρα θα αναπτυχθούν γρήγορα.
- Τα φύτρα πρέπει να σκληραγωγηθούν αμέσως για να μη μακρύνουν.
- Το προφύτρωμα δεν είναι απαραίτητο. Η Liseta μπορεί να φυτευτεί με μικρά άσπρα φύτρα.
- Προτιμά αργιλώδη ή ελαφρά πηλώδη εδάφη.
- Μη φυτέψεις πολύ νωρίς σε πολύ κρύο έδαφος. Η Liseta είναι λίγο ευαίσθητη στη κονδυλοποίηση των φύτρων.

Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια




- Το γρήγορο φύτεμα, γρήγορα αναπτύσσει πλούσιο φύλλωμα με καλή κάλυψη του εδάφους.
- Γρήγορη κονδυλοποίηση. Χρειάζεται κανονικό πότισμα.
- Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται κανονικοί ψεκασμοί στη κατάλληλη εποχή για τη καταπολέμηση του Περονόσπορου.
- Η Liseta είναι ευαίσθητη στον ιό Υηηη. Ψέκασε για τη καταπολέμηση των αφίδων, ειδικά αν θα χρησιμοποιήσεις σπόρο για τη Φθινοπωρινή καλλιέργεια.

Καταστροφή φυλλώματος και συγκομιδή



- Λίγο ευαίσθητη στις μηχανικές βλάβες αλλά μάλλον ευαίσθητη στους εσωτερικούς μύλωπες.
- Όταν η επιδερμίδα των κονδύλων είναι ψημένη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κατά τη συγκομιδή.

Αποθήκευση



- Η Liseta αποθηκεύεται καλά νοούμενου ότι συγκομίζεται προσεκτικά και αποθηκεύεται σε κατάλληλα ψυγεία.
- Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε σταθερά χαμηλές θερμοκρασίες, με πιθανό συνδυασμό αντιφυτρωτικών σκευασμάτων.
- Ευαίσθητη στο Φουζάριο (*Fusarium*) και τη Γάγγραινα (*Phoma*).