



Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης

Έκδοση 2010-1



- * Δυνατή φυλλωσιά, μεγάλη προσαρμοστικότητα
- * Πολύ καλή ανθεκτικότητα κατά τη συσκευασία
- * Ψηλή παραγωγή
- * Πολύ καλή για φθινοπωρινή καλλιέργεια
- * Γυαλιστερή και απαλή επιδερμίδα

Χαρακτηριστικά

Τύπος μαγειρέματος	AB – Ελαφρά σφιχτή
Ωρίμανση	Όψιμη
Παραγωγή	Πολύ ψηλή
Μέγεθος κονδύλων	Μεγάλοι
Σχήμα κονδύλων	Ωσειδείς
Αριθμός κονδύλων	6-8
Χρώμα σάρκας	Κίτρινο
Χρώμα επιδερμίδας	Κίτρινο

Περίοδος ληθάργου	Μακρύς
Φύτρωμα	Αργό
Ευαισθησία στο Sencor	Ελαφρά ευαίσθητη
Ανάπτυξη φυλλώματος	Δυνατή
Εσωτερικοί μύλωπες	Ευαίσθητη
Κονδυλοποίηση φύτρων	Δεν είναι ευαίσθητη
Ξηρή ουσία	20,5
UWW (βάρος σε νερό)	376

Χρυσονηματώδης: Ευαίσθητη: Ro1, Ro2/3

Καρκίνος των κονδύλων: Ανθεκτική: Fysio 1
Ευαίσθητη: Fysio 2, 6, 18

Δακτυλιοειδής κηλίδωση*	Ανθεκτική
Περονόσπορος φύλλων	Ελαφρά ευαίσθητη
Περονόσπορος κονδύλων	Ανθεκτική
Ακτινομύκωση	Ανθεκτική
Σπογγοσπορίωση	Ελαφρά ευαίσθητη
PVYn	Ελαφρά ευαίσθητη
Ανοχή κονδύλων Yntn	Ανεκτική

* Προκαλείται από τον ιό TRV

Πληθυσμοί φυτών

Βάθος φύτευσης: Κανονικό
Αποστάσεις φύτευσης όταν η απόσταση μεταξύ των αυλακιών είναι 75 εκ.

28/35 χλ.	4.950 φυτά/στρ.	Απόσταση φυτών ± 27 εκ.
35/50 χλ.	4.450 φυτά/στρ.	Απόσταση φυτών ± 30 εκ.
50/55 χλ.	4.050 φυτά/στρ.	Απόσταση φυτών ± 33 εκ.

Μέτρησε τους κονδύλους/σακί για σωστό υπολογισμό.

Λίπανση

Απαιτεί πολύ λίγη ποσότητα Αζωτούχου λίπανσης. Το πολύ Αζωτο καθυστερεί την ωρίμανση.


Η συγκομιδή της καλλιέργειας πολύ πριν την ωρίμανση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη ξηρή ουσία και την ποιότητα των κονδύλων.

Ενδεικτικά, η Αζωτούχος λίπανση να είναι περίπου 18 χλγ. N/στρ., περιλαμβανομένων και των αποθεμάτων εδάφους.
Φώσφορο ανάλογα με τις απαιτήσεις του εδάφους.

Συνιστάται επιπλέον λίπανση με Κάλιο. Αυτό έχει θετική επίδραση στο να αποφεύγεται ο μυλωπισμός των κονδύλων. Όμως, μη το εφαρμόσεις πολύ αργά γιατί μπορεί να μειώσει τη ξηρή ουσία.


Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης

Προετοιμασία και φύτεμα




- Ο λήθαργος είναι μακρύς. Παράλαβε το σπόρο έγκαιρα για να φυτρώσει.
- Συνιστάται προφύτρωμα για να έχουμε γρήγορο φύτρωμα και πρωιμότερη παραγωγή.
- Όταν κρατάς σπόρο για τη Φθινοπωρινή καλλιέργεια μην τον αποθηκεύσεις σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι να φυτέψεις.
- Φύτεψε αρκετά βαθειά. Όταν φυτέψεις ρηχά, λόγω του ότι η ποικιλία είναι πολύ παραγωγική, υπάρχει κίνδυνος να πρασινίσουν οι πατάτες.

Τι πρέπει να προσέξεις κατά την καλλιέργεια




- Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλους τους τύπους εδαφών.
- Η ποικιλία είναι ανεκτική στο Sencor (Metribuzin)
- Συνιστάται η καταπολέμηση της Ριζοκτόνιας, ειδικά κατά τη φθινοπωρινή καλλιέργεια.
- Το φύτρωμα είναι αργό, αλλά αργότερα αναπτύσσεται ένα πολύ δυνατό φύλλωμα.
- Η ποικιλία είναι ανθεκτική στον Περονόσπορο. Όμως πρόσεχε και ψέκασε όταν είναι ανάγκη.
- Είναι ευαίσθητη στον ιό PMTV ο οποίος μεταφέρεται από τη Σπογγόσπορα.
- Η ποικιλία είναι ανθεκτική στην Ακτινομύκωση και στη Σπογγόσπορα.

Καταστροφή φυλλώματος και συγκομιδή



- Άφησε την επιδερμίδα να ψηθεί προτού συγκομίσεις.
- Οι κόνδυλοι μπορεί να μεγαλώσουν πολύ. Απόφυγε το τραυματισμό κατά τη συγκομιδή και την αποθήκευση.
- Απόφυγε το πέσιμο των κονδύλων από ψηλά.

Αποθήκευση



- Μετά από μία καλή περίοδο επούλωσης των πληγών, η αποθήκευση δε θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.