


## Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης

έκδοση 2009 - 01

- \* Ψηλή παραγωγή
- \* Μεγάλοι κόνδυλοι
- \* Ανθεκτική στη ξηρασία και τη ζέστη
- \* Καλή περιεκτικότητα ξηρής ουσίας
- \* Μεγάλη προσαρμοστικότητα



### Χαρακτηριστικά

Τύπος μαγειρέματος	BC
Ωρίμανση	Μεσοόφιμη
Παραγωγή	Πολύ ψηλή
Μέγεθος κονδύλων	Πολύ μεγάλοι
Σχήμα κονδύλων	Μακρουλοί-ωοειδείς/μακρ.
Αριθμός κονδύλων	Μέσος όρος
Χρώμα σάρκας	Ελαφρά κίτρινη
Χρώμα επιδερμίδας	Κίτρινη
Μούρα	Δεν έχει
Περίοδος λήθαργου	Μέσος όρος
Φύτρωμα	Γρήγορο
Ανάπτυξη φυλλώματος	Πολύ καλή
Εσωτερικοί μώλωπες	Μάλλον ευαίσθητη
Κονδυλοποίηση φύτρων	Μάλλον ευαίσθητη
Ξηρή ουσία	20,4
Βάρος κάτω από νερό	373
Χρυσονηματώδης	Ευαίσθητη: Ro1,2/3,4,5 Pa2,3
Καρκίνος των κονδύλων	Ανθεκτική: fysisio 1
Δακτυλιοειδής κηλίδωση*	Ανθεκτική
Περονόσπορος φύλλων	Ευαίσθητη
Περονόσπορ. κονδύλων	Ευαίσθητη
Ακτινομύκωση	Ευαίσθητη
Σπογγοσπορίωση	Πολύ ευαίσθητη
PVYη	Ελαφρά ευαίσθητη
Ανοχή κονδύλων Yntn	Ελαφρά ευαίσθητη

\*Προκαλείται από τον ιό TRV

### Πληθυσμοί φυτών

Ενδεικτικές αποστάσεις φύτευσης όταν η απόσταση μεταξύ των αυλακιών είναι 75 εκ.

28/35 χλ. 4.400 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 30 εκ.  
35/50 χλ. 4.000 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 33 εκ.  
50/55 χλ. 3.700 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 36 εκ.

Κομμένος σπόρος μεγέθους:  
50/55/60 χλ. 3.900 φυτά/στρ. Απόστ. φυτών ± 34 εκ.

### Λίπανση


Η Αζωτούχος λίπανση είναι περίπου 25 χλγ Ν/στρ. περιλαμβανομένων και των αποθεμάτων εδάφους  
Συνιστάται σπαστή εφαρμογή, για να αποφύγουμε την υπερβολική ανάπτυξη του φυλλώματος στο ξεκίνημα.

Η Spunta είναι λίγο ευαίσθητη στην έλλειψη Μαγνησίου. Αν είναι ανάγκη ψέκασε με το κατάλληλο σκεύασμα στο σωστό χρόνο.

Η οργανική λίπανση έχει θετική επίδραση στην παραγωγή.

## Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης

### Προετοιμασία και φύτεμα




- Η επικράτηση του κορυφαίου φύτρου είναι μάλλον δυνατή.
- Δώσε ένα θερμικό σοκ στο κατάλληλο χρόνο για να πάρεις αρκετά φύτρα ανά κόνδυλο.
- Τα φύτρα πρέπει να σκληραγωγηθούν καλά για να αποφευχθεί το σπάσιμο κατά το φύτεμα.
- Φύτεψε στο κανονικό βάθος.
- Μάλλον ευαίσθητη στη κονδυλοποίηση των φύτρων.
- Καλλιεργείται σε όλους τους τύπους εδαφών. Όμως, ειδικά τα βαριά εδάφη χρειάζεται να έχουν καλή δομή για να αποφευχθεί η παραμόρφωση των κονδύλων.

### Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια




- Η κονδυλοποίηση είναι μάλλον γρήγορη.
- Ο αριθμός των κονδύλων ανά φυτό είναι μάλλον μικρός και οι κόνδυλοι αναπτύσσονται εύκολα σε μεγάλο μέγεθος.
- Στο κατάλληλο χρόνο ψέκασε προληπτικά για τη καταπολέμηση του Περονόσπορου.

### Καταστροφή φυλλώματος και συγκομιδή



- Η καταστροφή του φυλλώματος δεν είναι πρόβλημα. Οι κόνδυλοι εύκολα αποσπώνται από τους στόλωνες.
- Είναι ευαίσθητη στις μηχανικές βλάβες και λίγο ευαίσθητη στους μώλωπες.
- Η επιδερμίδα των κονδύλων πρέπει να είναι καλά ψημένη και η συγκομιδή να γίνει προσεκτικά.

### Αποθήκευση



- Όταν η συγκομιδή και η αποθήκευση γίνει προσεκτικά, η ποικιλία αποθηκεύεται καλά.
- Πρόσεξε τη καλή επούλωση των πληγών, διότι η ποικιλία είναι ευαίσθητη στο Φουζάριο και στις βακτηριακές αρρώστιες.