


Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης

έκδοση 2009 - 01

- * Μεγάλη προσαρμοστικότητα
- * Αξιόπιστη
- * Καλή παραγωγή
- * Κατάλληλη για διάφορες αγορές
- * Μεγάλοι και ομοιόμορφοι κόνδυλοι



Χαρακτηριστικά

Τύπος μαγειρέματος	B
Ωρίμανση	Μεσοπρώιμη
Παραγωγή	Ψηλή
Μέγεθος κονδύλων	Μεγάλοι
Σχήμα κονδύλων	Στρόγγυλοι-ωοειδείς/ωοειδ
Αριθμός κονδύλων	Μέσος όρος
Χρώμα σάρκας	Κίτρινη
Χρώμα επιδερμίδας	Κίτρινη
Μούρα	Δεν έχει
Περίοδος λήθαργου	Μακρύς
Φύτρωμα	Αργό
Ευαισθησία στο Sencor	Μέτρια ευαίσθητη
Ανάπτυξη φυλλώματος	Καλή
Εσωτερικοί μώλωπες	Μέτρια ευαίσθητη
Κονδυλοποίηση φύτρων	Μέτρια ευαίσθητη
Ξηρή ουσία	19,7
UWW (βάρος σε νερό)	360
Χρυσονηματώδης	Ανθεκτική: Ro1,4 Ελαφρά ευαίσθητη: Pa2 Ευαίσθητη: Ro2/3,5 Pa3
Καρκίνος των κονδύλων	Ανθεκτική: fysio 1 Ευαίσθητη: fysio 2
Δακτυλιοειδής κηλίδωση*	Ανθεκτική
Περονόσπορος φύλλων	Ευαίσθητη
Περονόσπορ. κονδύλων	Ανθεκτική
Ακτινομύκωση	Ελαφρά ευαίσθητη
Σπογγοσπορίωση	Ελαφρά ευαίσθητη
PVYη	Ελαφρά ευαίσθητη
Ανοχή κονδύλων Yntn	Ανθεκτική

*Προκαλείται από τον ιό TRV

Πληθυσμοί φυτών

Ενδεικτικές αποστάσεις φύτευσης όταν η απόσταση μεταξύ των αυλακιών είναι 75 εκ.

28/35 χλ. 4.450 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 30 εκ.
35/50 χλ. 3.800 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 35 εκ.
50/55 χλ. 3.500 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 38 εκ.


Λίπανση

Η Αζωτούχος λίπανση είναι περίπου 24 χλγ Ν/στρ. περιλαμβανομένων και των αποθεμάτων εδάφους. Συνιστάται σπαστή εφαρμογή, σε δύο δόσεις.

Κάλιο: Απαιτεί πλούσια Καλιούχο λίπανση διότι είναι ευαίσθητη στους μώλωπες. Μια επιπλέον δόση λίγο πριν την άνθηση μειώνει τη περιεκτικότητα ξηρής ουσίας και μ' αυτή την ευαισθησία της στους μώλωπες.

Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης

Προετοιμασία και φύτεμα




- Παρά το γεγονός ότι ο λήθαργος είναι μακρύς, εν τούτοις δε χρειάζεται προβλάστηση.
- Δεν υπάρχει ισχυρή επικράτηση του κορυφαίου φύτρου.
- Μη φυτέψεις σε πολύ κρύο έδαφος για να αποφύγεις τη κονδυλοποίηση των φύτρων.

Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια



- Κατάλληλη για όλους τους τύπους εδαφών.
- Αν και το φύτεμμα είναι αργό, εν τούτοις αργότερα η ανάπτυξη είναι πολύ ζωηρή με καλή κάλυψη του εδάφους.
- Συνιστώνται πρώιμοι ψεκασμοί για τη καταπολέμηση του Περονόσπορου.

Καταστροφή φυλλώματος και συγκομιδή



- Μετά την καταστροφή του φυσιολογικά ώριμου φυλλώματος, οι κόνδυλοι αποσπώνται εύκολα από τους στόλους.
- Περιορίσε το ύψος πτώσης κατά τη συγκομιδή και την αποθήκευση, για να μειώσεις τους μώλωπες και τις μηχανικές βλάβες.

Αποθήκευση



- Καλή αποθηκευτική ικανότητα, λόγω και του καλού λήθαργου.
- Η θερμοκρασία αποθήκευσης στο ψυγείο για πατάτες κατανάλωσης είναι 7°C. .
- Πολύ γρήγορη ψύξη και διακυμάνσεις της θερμοκρασίας θα ευνοήσουν τη ανάπτυξη Γάγγραινας (Rhoma).
- Η διαλογή και συσκευασία πρέπει να γίνεται με προσοχή. Η ποικιλία φαίνεται να είναι λίγο ευαίσθητη στο τριχοειδές σχίσσιμο.