


Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης

έκδοση 2009 - 01

- * Πολύ πρώιμη
- * Γεμάτοι κόνδυλοι
- * Ομοιόμορφο μέγεθος
- * Καλή παραγωγή
- * Κατάλληλη για πολύ πρώιμη παραγωγή



Χαρακτηριστικά

Τύπος μαγειρέματος	AB
Ωρίμανση	Πρώιμη
Παραγωγή	Καλή
Μέγεθος κονδύλων	Μεγάλοι
Σχήμα κονδύλων	Ωσειδείς
Αριθμός κονδύλων	Μέσος όρος
Χρώμα σάρκας	Ελαφρά κίτρινη
Χρώμα επιδερμίδας	Κίτρινη
Μούρα	Δεν έχει
Περίοδος λήθαργου	Σχετικά μικρός
Φύτρωμα	Κανονικό
Ευαισθησία στο Sencor	Μέτρια ευαίσθητη
Ανάπτυξη φυλλώματος	Μέτρια
Εσωτερικοί μώλωπες	Μέτρια ευαίσθητη
Κονδυλοποίηση φύτρων	Μέτρια ευαίσθητη
Ξηρή ουσία	18,6
Βάρος κάτω από νερό	337
Χρυσονηματώδης	Ανθεκτική: Ro1,4 Ελαφρά ευαίσθητη: Ro2/3 Ευαίσθητη: Ro5
Καρκίνος των κονδύλων	Ανθεκτική: fysio 1,2
Δακτυλιοειδής κηλίδωση*	Ανθεκτική
Περωνόσπορος φύλλων	Πολύ ευαίσθητη
Περωνόσπορ. κονδύλων	Ανθεκτική
Ακτινομύκωση	Ελαφρά ευαίσθητη
Σπογγοσπορίωση	Ελαφρά ευαίσθητη
PVYη	Ευαίσθητη
Ανοχή κονδύλων Yntn	Ελαφρά ευαίσθητη

*Προκαλείται από τον ιό TRV

Πληθυσμοί φυτών

Ενδεικτικές αποστάσεις φύτευσης όταν η απόσταση μεταξύ των αυλακιών είναι 75 εκ.

28/35 χλ. 4.750 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 28 εκ.
35/50 χλ. 4.150 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 32 εκ.
50/55 χλ. 3.800 φυτά/στρ. Απόσταση φυτών ± 35 εκ.


Λίπανση

Η Αζωτούχος λίπανση είναι περίπου 25 χλγ Ν/στρ. περιλαμβανομένων και των αποθεμάτων εδάφους. Σπαστή εφαρμογή του Αζώτου δεν έχει κάποιο όφελος για τη καλλιέργεια.

Κάλιο και Φώσφορο ανάλογα με τις απαιτήσεις του εδάφους.

Γενικές συμβουλές παραγωγής πατατών κατανάλωσης

Προετοιμασία και φύτεμα




- Η ποικιλία χρειάζεται ζέστη για να ξυπνήσουν τα μάτια, πράγμα που βοηθά τη γρήγορη ανάπτυξη της καλλιέργειας.
- Συνιστάται να γίνει η φύτευση όταν οι κόνδυλοι έχουν μικρά άσπρα φύτρα.
- Κάπως ευαίσθητη στη κονδυλοποίηση των φύτρων. Μη φυτέψεις πριν ξυπνήσουν τα μάτια και σε πολύ κρύο έδαφος.
- Τα καλύτερα αποτελέσματα λαμβάνονται σε ελαφρά αργιλώδη εδάφη με καλή δομή.
- Οι κόνδυλοι δένουν βαθιά στο σαμάρι, επομένως μη φυτεύεις πολύ βαθιά.

Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη καλλιέργεια



- Κανονικό φύτρωμα και μέτρια ανάπτυξη του φυλλώματος.
- Ο αριθμός των στελεχών είναι μάλλον μικρός, με καλή κάλυψη του εδάφους.
- Λόγω της πρωιμότητας της ποικιλίας, ο Περονόσπορος συνήθως δεν είναι πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά ψέκασε προληπτικά αν χρειαστεί.

Καταστροφή φυλλώματος και συγκομιδή



- Οι κόνδυλοι είναι μεγάλοι πολύ νωρίς. Η συγκομιδή γίνεται μετά από 90-100 μέρες.
- Καλή ανθεκτικότητα στους μώλωπες, αλλά είναι μάλλον ευαίσθητη στις μηχανικές βλάβες κατά τη συγκομιδή.
- Το ψήσιμο της επιδερμίδας δεν είναι γρήγορο. Η συγκομιδή γίνεται 2 βδομάδες μετά τη καταστροφή του φυλλώματος για να ψηθεί η επιδερμίδα.
- Συγκόμισε με προσοχή για να αποφύγεις το πλήγωμα των κονδύλων

Αποθήκευση



- Συνιστάται καλό στέγνωμα και επούλωση των πληγών.
- Μέτρια Ανθεκτικότητα στη Γάγγραινα (Phoma) και το Φουζάριο (Fusarium)..